KIRURGISK KLINIK
FREDERIKSSUND
Martin Poulsen, speciallæge i kirurgi

Information om operation i og omkring endetarmsåbningen

Operation i eller omkring endetarmsåbningen foretages, hvis der f.eks. skal fjernes hæmorider, marisker (løs hud efter hæmorider), kønsvorter eller bylder. Operationen udføres i lokalbedøvelse, der anlægges i det område, hvor der skal opereres. I enkelte tilfælde sys såret let sammen, men oftest lades det stå helt åbent for at nedsætte risikoen for betændelse (såret vil hele op af sig selv i løbet af nogle uger).

Blodfortyndende medicin og natur medicin

Hvis du er i behandling med **Hjertemagnyl, Pradaxa, Xarelto, Eliquis** eller **Lixiana**, skal du **ikke** tage medicinen i **2 dage før operationen**, og først starte op med medicinen to dage efter operationen.

Hvis du er i behandling med **Clopidogrel (Plavix, Grepid, Cloriocard), Efient, Brilique, Marevan eller Marcoumar** skal du **ikke** tage medicinen i **5 dage før operationen**, og først starte op med medicinen to dage efter operationen.

Hvis du er i tvivl, om du i det hele taget må holde pause med din blodfortyndende medicin, skal du kontakte din egen læge eller klinikken.

Hvis du til hverdag indtager **hvidløgskapsler, fiskeolie, ingefær eller ginkgo**, skal du **ikke** tage det i **7 dage før operationen**, og først starte op med det igen to dage efter operationen.

Efter operationen

Efter operationen lægges et stykke Spongostan (gelatinebaseret produkt der aktiverer blodpladerne og dermed hindrer blødning) samt et stykke gaze ind mod operationsstedet. Spongostan og gaze kan fjernes 2-3 timer senere.

De første 2-3 dage efter operationen kan du have svie, ubehag eller lette smerter i det opererede område. Du kan også opleve hævelse i området nogle dage efter operationen – denne hævelse aftager hurtigt igen. Mod eventuelle smerter kan du tage 2 tabletter Paracetamol 500 mg (Pamol, Pinex eller Panodil) sammen med 1 tablet Ibuprofen 200 mg (max 4 gange i døgnet).

For at lette afføringens passage forbi det opererede område kan du blødgøre afføringen med f.eks. svesker, Magnesia eller Lactulose (fås i håndkøb på apoteket). Desuden anbefales det at drikke rigeligt.

Såret heler op i løbet af 2-3 uger.

Der er ingen efterkontrol, men du er altid velkommen til at kontakte klinikken med spørgsmål.